

Crna azijska antilopa

Lat. *Antilope cervicapra*, eng. Blackbuck



RASPROSTRANJENOST

I STANIŠTE:

južna Azija
- travnjaci i blago
šumovita područja

KLASIFIKACIJA

Razred: sisavci
(Mammalia)

Red: parnoprstaši
(Artiodactyla)

Porodica: šupljorošci
(Bovidae)

NAČIN ŽIVOTA

Aktivnost: dnevne
životinje

Prehrana: trava,
cvijeće, voće, žitarice

Zajednica: živi u
stadima od 15 do 20
jedinki s dominantnim
mužjakom

Neprijatelj: gepard,
vuk, divlji pas, čovjek

RAZMNOŽAVANJE

Spolna zrelost: oko 15
mjeseci (466 dana)

Nošenje mladunaca: od
6 do 7 mjeseci

Broj mladih: 1 mlado

ZANIMLJIVOSTI

- trče brzinom većom od 80 km/h
- dnevno uzimaju veće količine vode
- rogovi imaju od jednog do četiri spiralna zavoja
- albinizam - rijetka ali moguća pojava uzrokovana nedostatkom pigmenta melanina

ZAŠTITA

IUCN kategorija:
NT - potencijalno
ugrožena
vrsta