

# Američki rakun

Lat. Procyon lotor, eng. Northern Raccoon

KARTA RASPROSTRANJENOSTI



## RASPROSTRANJENOST

### I STANIŠTE:

Južna Kanada, SAD, Srednja Amerika - miješane i bjelogorične šume uz vodu, prerije

## KLASIFIKACIJA

Razred: sisavci (Mammalia)

Red: zvijeri (Carnivora)

Porodica: rakuni (Procyonidae)

## NAČIN ŽIVOTA

Aktivnost: dnevne i noćne životinje

Prehrana: orašasti plodovi, voće, rakovi, kukci, glodavci, žabe, jaja ptica

Zajednica: ne stvaraju stabilne zajednice osim u vrijeme razmnožavanja

Neprijatelj: kojot, vuk, jastreb, sova, zmija

## RAZMNOŽAVANJE

Spolna zrelost: mužjaci oko 2. godine; ženke oko 1. godine

Nošenje mladunaca: od 60 do 73 dana

Broj mladih: od 3 do 7 (obično 4 mlada)

## ZANIMLJIVOSTI

- glasanje: zviždukanje, zavijanje, kreštanje, cvokotanje zubima, predenje
- tijekom zime spavaju duže vrijeme ali ne zimski san
- inteligentne su i mirne životinje
- stalno se penju po drveću
- mogu otvoriti zatvorena vrata
- prije nego pojedu hranu, ispiru ju u vodi

## ZAŠTITA

### IUCN

kategorija: LC - najmanje zabrinjavajuća