

Bradata agama



Lat. Pogona vitticeps
Eng. Bearded Dragon

KARTA RASPROSTRANJENOSTI



RASPROSTRANJENOST I STANIŠTE

- istočna i centralna Australija
- nastanjuje velika područja (pustinje, područja obrasla s rijetkom vegetacijom, šikare, suhe šume)

KLASIFIKACIJA

Razred: Reptilia
Red: Squamata
Porodica: Agamidae
Rod: Pogona
Vrsta: P. Vitticeps

NAČIN ŽIVOTA

Aktivnost: dnevno aktivni, vrijeme provode na povišenim mjestima na stijenama ili drveću tijekom jutra i kasno poslijepodne, dok se tijekom najtoplijeg dijela dana skrivaju u hladovinu
Prehrana: različite biljke, cvjetovi, insekti te povremeno mali glodavci ili manji gušteri
Neprijatelji: ptice grabljivice, varani i zmije

RAZMNOŽAVANJE

- s godinu dana postaju spolno zrele
- sezona parenja je u proljeće i ljetno od kolovoza do ožujka (Australija!), u zatočeništvu se mogu pariti tijekom cijele godine.
- ženke kopaju rupe i u njih polažu do 24 jaja iz kojih se nakon inkubacije od 55–75 dana izlegu mlade agame

ZANIMLJIVOSTI

- nazivaju se bradati zmajevi zbog "brade", s donje strane vrata na koži imaju šiljate ljuske
- mužjaci imaju širu glavu i veću bradu koja se, kad spoljavaju agresivnost, poveća i potamni
- boja kože im ovisi o boji tla u staništu u kojem očitavaju

ZAŠTITA IUCN

- nisu na IUCN crvenoj listi zaštićenih životinjskih vrsta,
- u Australiji ova vrsta je zaštićena i ne smije se uzimati iz prirode, a za njihovo držanje u zatočeništvu mora se ishoditi dozvola
- često se drže kao kućni ljubimci i lako se razmnožavaju u zatočeništvu