

Crvenovrati valabi

KARTA RASPROSTRANJENOSTI



Lat. *Macropus rufogriseus*
Eng. Red-necked Wallaby



RASPROSTRANJENOST I STANIŠTE

Istočna Australija,
Tasmanija
- šipražje eukaliptusove
šume

KLASIFIKACIJA

Razred: sisavci
(Mammalia)
Red: tobolčari
(Diprotodontia)
Porodica: klokani

NAČIN ŽIVOTA

Aktivnost: životinje noći i
sumraka
Prehrana: trava, zeljasto bilje,
lišće
Zajednica: žive samotnjački, ali
se ponekad udružuju u grupe do
30 jedinki
Kretanje: skakanje na
izduženim stražnjim nogama, dok
se dugim i snažnim repom
koriste za održavanje ravnoteže
Neprijatelji: dingo, čovjek

RAZMNOŽAVANJE

Spolna zrelost: ženke od 12
do 14 mjeseci, mužjaci sa 19
mjeseci
Nošenje mladunaca: oko 30
dana
Broj mladih: jedno mlado -
mladunac ulazi u tobolac
majke i tu se nastavlja razvijati
sljedećih 280 dana

ZANIMLJIVOSTI

- hlade se lizanjem
prednjih šapa i podlaktica
- postoje dvije podvrste
ovog valabija
- podvrsta koja živi na
Tasmaniji naziva se
Bennettov valabi

ZAŠTITA IUCN

IUCN kategorija:
LC - najmanje
zabrinjavajuća