

Kukuruzna zmija



Lat. *Pantherophis guttatus*
Eng. Corn snake

KARTA RASPROSTRANJENOSTI



RASPROSTRANJENOST I STANIŠTE

- istok i jugoistok SAD-a (New Jersey, Maryland, Kentucky, Louisiana, Alabama i Florida)
- nastanjuje šume, poljoprivredna zemljišta, prigradske četvrti

KLASIFIKACIJA

Razred: Reptilia

Red: Squamata

Porodica: Coubridae

NAČIN ŽIVOTA

Aktivnost: noćne životinje, ali u hladnom dijelu godine aktivne su i danju

Prehrana: insekti, žabe, gušteri, ptice i njihova jaja, miševi, štakori
Zajednica: mužjaci i ženke nalaze se skupa samo za vrijeme parenja (od ožujka do svibnja)

Neprijatelji: čovjek, ptice grabljivice i veće zmije

RAZMNOŽAVANJE

- spolno su zrele sa 16-18 mjeseci
- ženke polažu oko 25 jaja u vlažne i tople rupe u zemlji iz kojih se nakon 2 mjeseca pri temperaturi od 27,80 °C izlegu mlade zmije
- tijekom sezone parenja mužjaci i ženke se nalaze koristeći feromone.
- mužjaci se međusobno bore za ženke

ZANIMLJIVOSTI

- izvrstan je penjač i često ih nalazimo na stablima ali i u potkrovljima staja i kuća
- relativno mirna, nije otrovnica
- dugačka je 1-1,8 m, mužjaci veći od ženki
- ženke polažu oko 25 jaja u trulu vegetaciju iz kojih se nakon 2 mjeseca pri temperaturi od 27,80 °C izlegu mlade zmijsice

ZAŠTITA IUCN

LC – najmanje zabrinjavajuće