

Orijentalna (azijska) patuljasta vidra

KARTA RASPROSTRANJENOSTI



Lat. *Aonyx cinereus*
Engl. Asian small-clawed otter



RASPROSTRANJENOST I STANIŠTE

Naseljavaju tropska, obalna područja od južne Indije do Malajskog poluotoka te jug Kine

Najčešće se mogu vidjeti u plitkim slatkovodnim potocima i riječnim plićacima, močvarama, ali i uz obalu mora, u mangrovim šumama te u rižinim poljima

KLASIFIKACIJA

Razred: Mammalia

Red: Carnivora

Porodica: Mustelidae

Rod: Aonyx

Vrsta: *A. cinerea*

NAČIN ŽIVOTA

U prirodi žive u grupama od 12-15 jedinki koja se sastoji od alfa para te njihovih potomaka.

Međusobno se sporazumijevaju mirisom te glasanjem (koriste oko 12 različitih načina glasanja). Vrlo su aktivne kako u vodi tako i na kopnu.

Prehrana: rakovi, školjke, mekušci, žabe, ribe i kukci, ptice i njihova jaja
Životni vijek: u prirodi oko 10 godina, u zatočeništvu u prosjeku dožive 16-20 godina

RAZMNOŽAVANJE

Spolnu zrelost dostižu s oko godinu dana, ali se počinju pariti tek u dobi od oko 2 godine. Nakon trudnoće od 60-64 dana ženka na svijet donosi 1-6 mladih, u prosjeku dva. Mladunčad se rađa slijepa i otvara oči tek oko 40-tog dana života. Tek u devetom tjednu života kreću na "prvo plivanje". Alfa par, skupa s odraslim mladuncima, brine se za odgoj najmlađih.

ZANIMLJIVOSTI

Najmanja od pet vrsta vidri u Aziji, teži svega 2,7-5,4 kg, duga 40-60 cm, rep dužine oko 25-30 cm. Ima neobične prednje šape, poput ruke, s povećanim osjetom dodira, kratkim pandžama, te djelomično razvijenom plivačom kožicom. Za razliku od drugih vrsta vidri, provodi više vremena na kopnu nego u vodi.

ZAŠTITA IUCN

VU (osjetljiva vrsta)
CITES: Apendix II

- populacija u opadanju zbog uništavanja prirodnog staništa koje zamjenjuju plantaže čaja i kave
- zbog zagađenja okoliša (pesticidi) i izumiranja rakova i riba koji su osnova prehrane vidri