

Stjenoviti zamorac

KARTA RASPROSTRANJENOSTI



Lat. *Kerodon rupestris*
Eng. Rock cavy



RASPROSTRANJENOST I STANIŠTE

- endemska vrsta u području Caatinga na sjeveroistoku Brazila
- nastanjuje suha kamenita područja s niskom vegetacijom

KLASIFIKACIJA

Razred: Mammalia
Red: Rodentia
Porodica: Caviidae
Rod: Kerodon
Vrsta: *K. rupestris*

NAČIN ŽIVOTA

Stanište im je ograničeno na područje s granitnim stijenama u kojima nalaze skrovišta od predatora. Mužjaci unutar grupe čuvaju granicu teritorija i ženke koje su u jazbinama u šupljinama između kamenih gromada
Prehrana: lišće, pupoljci, cvjetovi, izdanci i kora gmlja i drveća, povremeno voće

RAZMNOŽAVANJE

Pare se tijekom cijele godine, u prosjeku imaju tri legla godišnje.
Ženka nakon trudnoće od 76 dana okoti 1-3 mladunca.
O mladima se brinu oba roditelja
Spolna zrelost: s oko 130 dana

ZANIMLJIVOSTI

Jako su dobri penjači i često ih se može vidjeti na drveću
Tijekom parenja više mužjaka okruži jednu ženku kako bi spriječili njezin bijeg
Životni vijek: u prirodi oko 5 godina, u zatočeništvu puno duže, zabilježeno čak i 11 godina

ZAŠTITA IUCN

LC – najmanje zabrinjavajuće